

Rasbeschrijving Consumptie

MARKIES

Fianna x Agria



Eigenschappen

Rijptijd	Laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Langovaal
Knolaantal	9-12
Vleeskleur na koken	Licht geel
Schilkleur	Geel
Besvorming	Weinig
Kiemrust	Lang
Opkomst	Normaal
Loofontwikkeling	Traag
Onderwatergewicht	420

Resistenties

Aardappelmoetheid	Resistent Ro1, Ro4
Wratziekte	Vatbaar
Kringerigheid	Vrij resistent
Phytophthora loof	Vrij resistent
Phytophthora knol	Vrij resistent
Schurft	Weinig resistent
Poederschurft	Vatbaar
YN-virus	Vrij resistent
Yntn-virus tolerantie	Vrij resistent

Teeltadvies

Bodem : geschikt voor alle grondsoorten (op klei , kans op hol en lagere opbrengst dan op zandgronden).

Plantafstand voor fritesaardappelen :



afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg
uitgaande van een rijafstand van 75 cm

35/50	34-36 cm
50/55 (gesneden)	28-30 cm
50/60 (gesneden)	30-34 cm
55/60 (gesneden)	34-36 cm

Bemesting :

- *Stikstof* : Ca. 25-50kg minder dan Bintje. 2/3 van de totale gift voor het poten toepassen, 1/3 na de knolzetting.
- *Fosfaat* : volgens advies bodemonderzoek.
- *Kali* : volgens advies bodemonderzoek.

Bewaring : geschikt voor lange bewaring (bewaartemperatuur ongeveer 7°C).

Kiemremming : Gebruik van vloeibare kiemremmer is mogelijk, maar de voorkeur is duidelijk om alleen te gassen.

Voorzorgsmaatregelen : Weinig gevoelig voor Sencor, vrij gevoelig voor rooibeschadigingen en stootblauw

Andere opmerkingen : Zeer gevoelig voor Alternaria.