

Rasbeschrijving Consumptie

AGRIA

Quarta x Semlo



Eigenschappen

Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Ovaal tot langovaal
Knolaantal	7-10
Vleeskleur na koken	Geel
Schilkleur	Geel
Besvorming	Geen
Kiemrust	Vrij lang
Opkomst	Traag
Loofontwikkeling	Traag
Onderwatergewicht	380

Resistenties

Aardappelmoetheid	Resistent Ro1 en 4
Wratziekte	Vatbaar
Kringerigheid	Vrij resistent
Phytophthora loof	Weinig vatbaar
Phytophthora knol	Vrij resistent
Schurft	Vatbaar
Poederschurft	Zeer vatbaar
YN-virus	Vrij resistent
Yntn-virus tolerantie	Vrij resistent

Teeltadvies

Bodem : geschikt voor alle grondsoorten, behalve lichte zandgronden (kans op schurft, holheid en laag OWG).

<u>Plantafstand voor fritesaardappelen</u> :	28/35	18-22 cm
⚠ afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg	35/50	26-30 cm
	50/60 (gesneden)	26-30 cm

Bemesting :

Stikstof : Ca. 12 tot 15% minder dan Bintje. Teveel stikstof verlaagt OWG en verlaat oogstrijptijd.

Fosfaat : volgens advies bodemonderzoek.

Kali : volgens advies bodemonderzoek. Chloorkali is zowel in het voorjaar en als overbemesting sterk af te raden i.v.m. risico op te laag OWG.

Bewaring : goede bewaring (bewaartemperatuur ongeveer 7°C).

Kiemremming : Gebruik van vloeibare kiemremmer is mogelijk, maar de voorkeur is duidelijk om alleen te gassen.

Voorzorgsmaatregelen : Gevoelig voor schurft (op zandgronden), gevoelig voor Alternaria, weinig gevoelig voor Sencor. Matig gevoelig voor hol in knol, vrij gevoelig voor rooibeschatiging, weinig gevoelig voor stootblauw.

Andere opmerkingen : Na het oogsten het product zo snel mogelijk droog draaien en droog houden. Wanneer door weersomstandigheden het inschuren voor enige tijd wordt onderbroken, dient direct te worden gestart met drogen van de aardappelen in de box.