



Rasbeschrijving Consumptie

ASTERIX

Cardinal x SVP VE 70-9

Eigenschappen

Rijptijd	Laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Langovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Lichtgeel
Schilkleur	Rood
Besvorming	Weinig
Kiemrust	Gemiddeld
Opkomst	Goed
Loofontwikkeling	Snel
Onderwatergewicht	420

Resistenties

Aardappelmoetheid	Resistent Ro 1
Wratziekte	Resistent fysio 1
Kringerigheid	Resistent
Phytophthora loof	Matig resistent
Phytophthora knol	Vrij resistent
Schurft	Weinig vatbaar
Poederschurft	Weinig vatbaar
YN-virus	Matig resistent
Yntn-virus tolerantie	Weinig gevoelig

Teeltadvies

Bodem : geschikt voor alle grondsoorten.

<u>Plantafstand voor fritesaardappelen</u> :	28/35	30-32 cm
⚠ afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg	35/50	36-40 cm
	50/60 (gesneden)	36-38 cm

Bemesting :

- *Stikstof* : Ca 15% minder dan Bintje. 2/3 van de totale gift voor het poten toepassen, 1/3 na de knolzetting. Voorkom overmaat aan N (negatief invloed op knolzetting, verlaagt OWG en verlaagt oogstrijptijd).
- *Fosfaat en kali* : Volgens bodemonderzoek. Asterix is magnesiumbehoefstig.

Bewaring : Goede bewaring (bewaartemperatuur ongeveer 8°C).

Kiemremming : Het gebruik van kiemremmingmiddelen tijdens het inschuren wordt afgeraden vanwege de gevoeligheid met poederbrand.

Voorzorgsmaatregelen : Vrij gevoelig voor Sencor, vrij gevoelig voor stootblauw en beschadiging.