



Rasbeschrijving Consumptie

MIRANDA

Agria x AG84-009

Eigenschappen


Rijptijd	Vroeg
Opbrengst	Goed tot hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Langovaal
Knolaantal	10-12
Vleeskleur na koken	Lichtgeel
Schilkleur	Geel
Besvorming	Geen
Kiemrust	Goed
Opkomst	Gemiddeld
Loofontwikkeling	Goed
Onderwatergewicht	370

Resistenties

Aardappelmoetheid	Resistent Ro1, Ro4
Wratziekte	Resistent fysio 1 en 6
Kringrigheid	Matig resistent
Phytophthora loof	Weinig vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Gemiddeld
Poederschurft	Matig resistent
YN-virus	Weinig vatbaar
Yntn-virus tolerantie	Weinig vatbaar

Teeltadvies

Bodem : bij voorkeur geschikt voor zand en lichte zavelgronden.

<u>Plantafstand voor fritesaardappelen</u> :	35/50	34-38 cm
 afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg	50/60 (gesneden)	32-36 cm

Bemesting :

- *Stikstof* : Miranda heeft een gemiddelde N-behoefte. $\frac{3}{4}$ van de totale gift voor het poten toepassen, $\frac{1}{4}$ rond de bloei. Geen late N-gift ivm te laag OWG.
- *Fosfaat* : volgens advies bodemonderzoek.
- *Kali* : volgens advies bodemonderzoek. Geen chloorkali toepassen in het voorjaar, voor het poten en/of over het gewas tijdens de groeiseizoen.
- Een extra toediening van Magnesium en Mangaan vroeg in de teeltseizoen wordt geadviseerd.

Bewaring : Afland levering (korte bewaring mogelijk).

Kiemremming : Niet van toepassing.

Voorzorgsmaatregelen : gevoelig voor Alternaria, iets gevoelig voor blauw en beschadigingen, matig gevoelig voor Sencor (maximum dosering 250 gr/ha).

Andere opmerkingen : Miranda heeft de raseigenschap om iets hoger in de rug te groeien. Bovenkant poters ca. 2cm onder maaiveld en grote ruggen vormen, om groene knollen te voorkomen. Loofdoding voor oogst is gewenst om een te laag OWG te voorkomen.