



Rasbeschrijving Consumptie

**VICTORIA**

Agria x Rop J 861

**Eigenschappen**

Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Goed
Grofheid	Grof
Knolvorm	Langovaal
Knolaantal	9-11
Vleeskleur na koken	Licht geel
Schilkleur	Geel
Besvorming	Weinig
Kiemrust	Lang
Opkomst	Normaal
Loofontwikkeling	Goed
Onderwatergewicht	380

**Resistenties**

Aardappelmoetheid	Resistent Ro1, Ro4
Wratziekte	Resistent fysio 1
Kringerigheid	Resistent
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Vatbaar
Poederschurft	Zeer vatbaar
YN-virus	Weinig vatbaar
Yntn-virus tolerantie	Weinig gevoelig

**Teeltadvies**

Bodem : bij voorkeur kleigrond, maar ook zavelgrond.

<u>Plantafstand voor fritesaardappelen</u> :	35/50	32-36 cm
⚠ afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg	50/60 (gesneden)	30-34 cm

Bemesting :

- *Stikstof* : Victoria heeft een gemiddelde N-behoefte (ca 250kg/ha, incl. bodemvoorraad). Basisbemesting min. 150kg, 1<sup>e</sup> overbemesting direct na knolzetting. Voorkom overmaat aan N (negatief invloed op knolzetting, verlaagt OWG en verlaat oogstrijptijd).
- *Fosfaat* : Volgens bodemonderzoek.
- *Kali* : 10% hoger dan Bintje. Chloorkali is zowel in het voorjaar en als overbemesting sterk af te raden i.v.m. risico op te laag OWG.

Bewaring : Geschikt voor extra lange bewaring (bewaartemperatuur ongeveer 6°C).

Kiemremming : Gebruik van vloeibare kiemremmer is mogelijk, maar de voorkeur is duidelijk om alleen te gassen.

Voorzorgsmaatregelen : Matig gevoelig voor Sencor, gemiddeld gevoelig voor blauw en beschadigingen.