

## Caractéristiques

▪ Précocité	6 (moyenne)	▪ Mildiou - tubercule	6,5
▪ Couleur de peau	Jaune	▪ Gale	7
▪ Couleur de chair	Jaune pâle	▪ Nématodes Ro 1, 4	Résistant
▪ Tubercules par pied	13	▪ Galle verruqueuse f1	Résistant
▪ Grosseur des tubercules	8	▪ Virus rattle du tabac TRV	7
▪ Coups bleus	8	▪ Type de cuisson	B
▪ Endommagements	6	▪ Fritabilité	8
▪ Rendement	Élevé	▪ Dormance	8
▪ Matière sèche / Poids sous l'eau	22,2 / 390	▪ Conservation	7
▪ Mildiou - feuillage	4,5		

## Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	90 cm entre buttes	75 cm entre buttes	Densité
28/35	20-23 cm	23-25 cm	55.000 pl./ha
35/45	24-27 cm	29-31 cm	45.000 pl./ha
35/50	26-29 cm	31-33 cm	42.000 pl./ha
50/60 (plant coupé)	26-29 cm	31-33 cm	42.000 pl./ha

(Planter légèrement plus serré sur les sols argileux plus lourds)

## Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	% par rapport à la norme	Application	
		1 <sup>ère</sup>	2 <sup>e</sup>
N	100	3/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4	
K <sub>2</sub> O	100	4/4	

## Précautions

- Plantation au stade "points blancs". Ne pas planter trop tôt!
- Planter 2 cm sous le niveau du sol.
- Edison est légèrement sensible au Sencoral.
- Suivre un calendrier de pulvérisation mildiou normal. **Commencer à temps la prévention contre l'Alternaria.**
- 2d apport d'azote peu après l'initiation des tubercules.
- Après défanage, laisser suffisamment de temps aux tubercules pour former la peau afin d'éviter les endommagements à la récolte.
- Après la cicatrisation, refroidir doucement et conserver à une température stable de 7 °C.