

Description variétale

Fontane



Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| ▪ Précocité | 5,5 (semi-tardive) | ▪ Mildiou - tubercule | 6,5 |
| ▪ Couleur de peau | Jaune | ▪ Gale | 6 |
| ▪ Couleur de chair | Jaune clair à jaune | ▪ Nématodes Ro 1, 4 | Résistant |
| ▪ Tubercules par pied | 13-15 | ▪ Galle verruqueuse | 6 |
| ▪ Grosseur des tubercules | 7,5 | ▪ Virus rattle du tabac TRV | 6,5 |
| ▪ Coups bleus | 6 | ▪ Type de cuisson | BC |
| ▪ Endommagements | 6 | ▪ Fritabilité | 8 |
| ▪ Rendement | Élevé | ▪ Dormance | 6 |
| ▪ Matière sèche / Poids sous l'eau | 23,1 / 430 | ▪ Conservation | 7 |
| ▪ Mildiou - feuillage | 5 | | |

Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

| Calibre | 90 cm entre buttes | 75 cm entre buttes | Densité |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 28/35 | 21-24 cm | 25-27 cm | 51.000 pl./ha |
| 35/50 | 30-34 cm | 36-38 cm | 36.000 pl./ha |
| 50/55 | 33-36 cm | 38-40 cm | 33.000 pl./ha |
| 50/60 (plant coupé) | 29-32 cm | 34-36 cm | 38.000 pl./ha |

Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

| Engrais | % par rapport à la norme | Application | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | 1 ^{ère} | 2 ^e |
| N | 120 | 2/3 | 1/3 |
| P ₂ O ₅ | 100 | 4/4 | |
| K ₂ O | 110 | 3/4 | 1/4 |

Si le poids sous l'eau est structurellement >440, envisager d'utiliser de la potasse sous forme chlorure. La potasse réduit la sensibilité aux coups. Privilégier des engrais à base d'oligoéléments.

Précautions

- Ne pas planter les plants à froid en sortie de frigo. Les laisser d'abord réchauffer et planter au stade « points blancs ».
- La Fontane n'est pas ou peu sensible au Sencoral.
- 2e application d'azote après tubérisation.
- Suivre un calendrier de pulvérisation mildiou normal. L'utilisation d'hydrazide maléique est recommandée pour une conservation prolongée.
- Bien laisser se former la peau dans les parcelles défanées chimiquement, **la Fontane est moyennement sensible aux endommagements mécaniques et coups.**
- Après cicatrisation, refroidir progressivement à nouveau et conserver à une température stable de 7 °C.