

Description variétale

Lady Jane



Caractéristiques

▪ Précocité	6 (moyenne)	▪ Mildiou - tubercule	7
▪ Couleur de peau	Jaune foncé	▪ Gale	6,5
▪ Couleur de chair	Jaune	▪ Nématodes Ro 1, 4	Résistant
▪ Tubercules par pied	14	▪ Galle verruqueuse f1	Résistant
▪ Grosseur des tubercules	8	▪ Virus rattle du tabac TRV	5
▪ Coups bleus	5	▪ Type de cuisson	C
▪ Endommagements	6	▪ Fritabilité	8
▪ Rendement	Assez élevé	▪ Dormance	6,5
▪ Matière sèche / Poids sous l'eau	22,6 / 420	▪ Conservation	7
▪ Mildiou - feuillage	8		

Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	90 cm entre buttes	75 cm entre buttes	Densité
28/35	20-23 cm	24-27 cm	54.000 pl./ha
35/50	29-32 cm	35-38 cm	38.000 pl./ha
35/55	30-33 cm	37-40 cm	36.000 pl./ha

(Planter légèrement plus serré sur les sols argileux plus lourds)

Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	% par rapport à la norme	Application	
		1 ^{ère}	2 ^e
N	100	2/3	1/3
P ₂ O ₅	100	4/4	
K ₂ O	125	3/4	1/4

Si nécessaire selon l'analyse : ajouter une petite quantité de B, Mg, Mn, S. Sur les sols sensibles, utiliser du Calcium et du Bore contre les défauts internes.

Précautions

- Plantation au stade "points blancs". Planter 4 cm sous le niveau du sol.
- Lady Jane est légèrement sensible au Sencoral.
- Suivre un calendrier de pulvérisation mildiou normal.
- Faire un apport de K avant la plantation et à la tubérisation. Second apport d'azote peu après l'initiation des tubercules.
- Après défanage, laisser suffisamment de temps aux tubercules pour former la peau afin d'éviter les endommagements à la récolte.
- Après cicatrisation, refroidir progressivement à nouveau et conserver à une température stable de 7 °C.