

Lady Anna

CMK 93-042-005 x Fontane



Eigenschappen

Rijptijd	Middenlaat
Opbrengst	Goed
Grofheid	Goed
Knolvorm	Lang
Knolaantal	12-15
Vleeskleur na koken	Licht geel
Schilkleur	Geel
Besvorming	Matig
Kiemrust	Goed
Opkomst	Trage begin loofontwikkeling
Onderwatergewicht	430

Resistenties

Aardappelmoehheid	Ro 1, 2, 3 en Pa2
Wratziekte	Fysio 1
Tabaksratelvirus	Vatbaar
Phytophthora loof	Weinig resistent
Phytophthora knol	Vrij resistent
Schurft	Vrij resistent
YN-virus	Vrij resistent
Yntn-virus tolerantie	Vrij resistent

Teeltadvies

Bodem : Niet op zandgronden die gevoelig zijn voor bruinverkleuring in het vlees/tabaksratelvirus. Bij voorkeur op gronden van 15% afslibbaar of hoger.

Plantafstand voor fritesaardappelen :	35/45	40 cm
⚠ afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg	45/50 (gesneden)	35 cm
uitgaande van een rijafstand van 75 cm	50/60 (gesneden)	38 cm

Bemesting :

- **Stikstof :** Verdelen over 3 giften: basisgift van 200 kg N minus bodemvoorraad gevolgd door 2 giften van respectievelijk 50 en 25 kg N voor en na het sluiten van het gewas. De laatste gift bij voorkeur in de vorm van bladbemesting.
- **Fosfaat :** volgens advies bodemonderzoek.
- **Kali :** Adviesgift +30kg. Chloor houdende kali als overbemesting is geen probleem vanwege het hoge OWG.

Bewaring : Geschikt voor middellange tot lange bewaring (bewaar temperatuur ongeveer 7° C).

Kiemremming : Gebruik van vloeibare kiemremmer is mogelijk, maar de voorkeur is duidelijk om alleen te gassen.

Voorzorgsmaatregelen : Poten: niet te vroeg, niet te diep (op maaiveld) en niet in koude grond. Pootgoed goed los laten komen, kiemen niet beschadigen. Diep rooien. Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren. Weinig gevoelig voor Sencor.