



Rasbeschrijving Consumptie

ZORBA

CIP312/35 x Carola

Eigenschappen


| | |
|---------------------|---------------|
| Rijptijd | Vroeg |
| Opbrengst | Goed tot hoog |
| Grofheid | Grof |
| Knolvorm | Lang |
| Knolaantal | 10-13 |
| Vleeskleur na koken | Lichtgeel |
| Schilkleur | Geel |
| Besvorming | Weinig |
| Kiemrust | Gemiddeld |
| Opkomst | Goed |
| Loofontwikkeling | Snel |
| Onderwatergewicht | 410 |

Resistenties

| | |
|-----------------------|------------------|
| Aardappelmoetheid | Vatbaar |
| Wratziekte | Vatbaar |
| Kringerigheid | Matig resistent |
| Phytophthora loof | Vrij resistent |
| Phytophthora knol | Weinig resistent |
| Schurft | Vrij resistent |
| Poederschurft | Vrij resistent |
| YN-virus | Resistent |
| Yntn-virus tolerantie | Tolerant |

Teeltadvies

Bodem : geschikt voor alle grondsoorten, kans op lagere opbrengst op klei.

| | | |
|--|------------------|----------|
| <u>Plantafstand voor fritesaardappelen</u> : | 35/50 | 34-38 cm |
|  afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg uitgaande van een rijafstand van 75 cm | 50/60 (gesneden) | 30-34 cm |

Bemesting :

- *Stikstof* : Zorba heeft een ruime N-behoefte (vergelijkbaar met Bintje). 2/3 van de totale gift voor het poten toepassen, 1/3 na de knolzetting.
- *Fosfaat en Kali*: volgens advies bodemonderzoek.
- Vanaf opkomst enige malen een Borium bladmeststof toepassen. Regelmatig bladbemesting toevoegen i.v.m. gevoeligheid voor magnesium- en mangaangebrek.

Bewaring : Afland aflevering (korte bewaring mogelijk).

Kiemremming : Niet van toepassing.

Voorzorgsmaatregelen : Weinig gevoelig voor Sencor, gevoelig voor droogte, weinig gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw.

Andere opmerkingen : Bovenkant poters ca. 2cm onder maaiveld en grote ruggen vormen, om groene knollen te voorkomen. Bij lichte gronden, aanbeveling granulaat ter bestrijding van vreterij en vrijlevende aaltjes.