

# Bewaarverliezen meten

## 1. Rapen

- » Raap vier monsters elk van ongeveer tien kg.
- » Let wel op dat er geen rotte, halve of zwaar beschadigde knollen in het monster zitten. Ook kluiten, losse grond en kleikappen zijn niet wenselijk.



## 2. Behandelen met CIPC

- » Aardappelen die voor lange bewaring (na januari) de schuur in gaan, kunnen eigenlijk niet zonder kiemremming.



## 4. Wegen

- » Weeg de monsters één voor één op een goed afgestelde weegschaal. Een nauwkeurige weegschaal weegt per tien gram.
- » Schrijf de gewichten op en noteer de datum.



## 3. Labelen

- » Stop het monster in een netzak en voeg een label toe om de zak later te herkennen.
- » Onze tip: plaats één label aan de zak en een label in de zak.
- » Geef elk monster een uniek nummer en vermeld waar het monster wordt ingebracht.



## 5. Verdeel de monsters

- » Breng twee monsters onderin de partij en twee monsters bovenin de partij.
- » Let er daarbij op dat er een laag van 20 cm aardappelen over de zak heen ligt.



## 6. Bereken het bewaarverlies

- » Weeg de zakken bij het afleveren. Vervolgens kunt u het gewichtsverlies van het monster berekenen.
- » Ook op tussentijdse momenten is het mogelijk om de twee bovenste monsters uit te graven, te wegen en weer in te brengen. Zo krijgt u inzicht welke bewaarfase (drogen, koelen, constante temperatuur) leidt tot welke gewichtsverliezen.
- » Pas wel op met scheppen in de buurt van de netzak om te voorkomen dat deze scheurt.